



Títol del treball:	Grau de concordança entre el diagnòstic extrahospitalari i a l'alta en pacients atesos a nivell extrahospitalari amb unitats de suport vital avançat amb infermeria.
---------------------------	--

Nom i cognoms del ponent:	Elena Badal Corona
Adreça correu electrònic ponent:	
Telèfon de contacte:	

Autors

Nom i cognoms	Categoria professional	Institució / Lloc de treball
1. Elena Badal Corona	DUE	HUMT/UCIES i SEM
2. Sergi Mayol Barrera	DUE	HUMT/SEM
3.		
4.		
5.		
6.		

Resum de la recerca:

Ha de tenir els següents apartats: introducció, objectius, metodologia, resultats i conclusions. Opcional, màxim dues taules de resultats.

Extensió màxima 650 paraules.

Introducció i objectius

La investigació sobre l'atenció extrahospitalària no és molt extensa, i cada vegada més, els autors conclouen en la necessitat de potenciar-la per tal de poder tenir una atenció extrahospitalària de qualitat. El principal motiu és l'important paper que desenvolupa l'assistència extrahospitalària en pacients que pateixen alguna patologia temps-dependent.

Normalment el personal que treballa en aquest sector és el primer actuant, i per tant, és qui decideix com s'encaminarà el tractament i qui pren les primeres decisions sanitàries, s'ha cregut important el fet de poder analitzar aquesta assistència.

L'objectiu general d'aquest estudi és poder comparar la concordança diagnòstica dels pacients atesos a nivell extrahospitalari amb una unitat de Suport Vital Avançat amb Infermeria (USVAI) i el seu diagnòstic a l'alta. Com a objectiu secundari, s'analitzarà si s'associa o no a un pitjor grau de concordança diagnòstica extrahospitalària-hospitalària de l'especialitat per la qual consulten.



Metodologia

L'estudi presentat es tracta d'un estudi observacional, descriptiu, longitudinal i prospectiu. S'ha inclòs a tots els pacients atesos per la USVAI N-404 i que posteriorment hagin estat derivats a l'Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT) en el període comprès entre octubre i desembre del 2017. Durant aquest període s'han inclòs a pacients majors de 14 anys atesos per la unitat amb codificació de valoració sindròmica del SEM i s'han exclòs els pacients amb diagnòstics sense codi i els pacients amb dades de diagnòstic, atenció del SEM i/o de l'alta hospitalària incompletes.

La variable principal de l'estudi és la concordança diagnòstica extrahospitalària-hospitalària. Per poder-la avaluar s'ha utilitzat la codificació sindròmica de diagnòstics extrets del CIE9MC. S'ha avaluat establint el nombre de pacients on s'ha obtingut concordança, i s'han estratificat tres nivells determinats per la quantitat de números que han coincidit. Els pacients inclosos han estat atesos per la unitat i posteriorment traslladats a l'HUMT.

S'ha procedit a la revisió dels informes assistencials dels pacients inclosos per poder extreure els codis de valoració sindròmica assignats extrahospitalàriament. Posteriorment, s'ha revisat els diagnòstics de cada paciente a l'alta hospitalària. Amb aquestes dades s'ha comparat el grau de concordança extrahospitalària-hospitalària i, posteriorment en funció de l'especificitat que s'ha obtingut, s'ha assignat un grup (concordança baixa, mitja o alta).

Resultats

D'un total de 226 pacients, un 54,87% són homes i el 45,13% restant dones. D'aquests pacients, en 111 casos (49,41%) s'ha obtingut concordança diagnòstica. Si es mira segons l'estratificació realitzada en els tres nivells obtenim: concordança alta (CA) un 41%, concordança mitjana (CM) un 3,54% i concordança baixa (CB) un 4,87%.

Del total de 226 pacients, un total de 16 pacients (7,08%) han estat exclosos de l'estudi.

Si se separa per especialitats, obtenim que un 67,25% són pacients que han consultat per medicina interna (MI), mentre que un 25,66% han consultat per altres especialitats com poden ser cirurgia, traumatologia, psiquiatria i ginecologia entre altres.

Dels pacients visitats per MI (152 casos) un 53,93% s'ha obtingut concordança. Un 44,07% CA, un 5,26% CM i un 4,60% CB. Dels pacients que consulten per altres especialitats, la concordança ha estat de 49,99% (43,10% CA, 0% CM i 6,89% CB).

Conclusions

Dels resultats obtinguts es pot observar que el percentatge de concordança no és molt elevat. Encara i així, els resultats mostren que un important grup de pacients consulten per patologies relacionades amb MI on la concordança és més elevada. Cal tenir en compte que el personal de l'àmbit extrahospitalari no està dotat del mateix material que a nivell hospitalari i que les condicions no són les mateixes.


S'ha de contemplar que els codis de patologia que s'assignen a nivell extrahospitalari pertanyen a un recull dels codis del CIE9MC que ha realitzat el SEM, els quals tenen un caràcter molt més genèric. A nivell hospitalari es disposa de molts més codis per poder determinar amb més detall la patologia.



Considero que seria interessant poder realitzar aquest estudi en un àmbit més ampli per tal de poder incloure més dotacions i poder donar més variabilitat a la mostra de pacients resultats obtinguts.

Grau de concordança:

● CA ● CM ● CB ● NO CONCORDA ● EXCLOSOS



Consulta per especialitats:

● MI ● ALTRES

