



I. INFORMACIÓ SOBRE LES VACUNES NO FINANÇADES PEL DEPARTAMENT DE SALUT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

A partir dels 2 mesos d'edat, el seu fill començarà a rebre les vacunes previstes al calendari oficial de vacunacions de Catalunya. Aquest calendari es pot consultar al Carnet de Salut (llibre blau).

Existeixen algunes vacunes que, tot i ser recomanades per associacions científiques, no estan finançades, i algunes ho estan a l'edat pediàtrica però no en l'edat adulta.

Si el seu pediatre o metge de família ho considera recomanable les hi pot prescriure.

Aquestes vacunes són les següents:

– Vacuna contra la varicel·la:

S'ha inclòs al calendari vacunal (juliol 2016) als 15 mesos i als 3 anys; es manté també l'administració de la vacuna en campanya escolar a 6è de primària.

Si el seu fill/a està fora d'aquests marges i vostès volen vacunar-lo abans del que indica el calendari, caldrà que el seu metge els signi el consentiment per a la seva administració i el cost de la vacuna anirà a compte seu.

També és una vacuna recomanada per a adults que no han passat la malaltia i el seu metge de família els la pot prescriure. Si vostè es troba en edat fèrtil i el resultat analític és negatiu pot vacunar-se gratuïtament.

<http://vacunasaep.org/familias/vacunas-una-a-una/vacuna-varicela>

– Vacuna contra el pneumococ:

El pneumococ és un bacteri que pot produir infeccions greus com meningitis, pneumònies i sèpsia.

Aquesta vacuna s'ha inclòs al calendari vacunal del 2016 als 2, 4 i 11 mesos d'edat.

Si el seu fill/a està fora d'aquests marges i/o el seu metge els la recomana i no formen part de cap grup de risc previst, els la poden prescriure i el cost de la vacuna anirà a compte seu.

Al mercat hi ha dues vacunes disponibles: Prevenar 13 (PFIZER) i Synflorix (GSK).

Aquestes vacunes **NO** són intercanviables. Per tant, ha de començar i acabar amb la mateixa marca.

Les dosis de vacunes a administrar dependrà de l'edat en què es vacunin; el seu metge o infermera els indicaran les dosis necessàries.

<http://vacunasaep.org/familias/vacunas-una-a-una/neumococo>

– Vacuna contra el rotavirus:

El rotavirus és un virus que pot donar lloc a gastroenteritis en lactants i nens petits, amb vòmits i diarrees, i a vegades febre alta. Normalment es tracta d'una infecció lleu i autolimitada sense tractament, però en alguns casos el nen pot arribar a deshidratar-se.

Aquesta vacuna s'administra per via oral. Al mercat hi ha dues vacunes disponibles:

ROTATEQ® (MSD), que s'administra en 3 dosis i s'ha de començar entre les 6-12 setmanes i finalitzar abans dels 8 mesos; l'interval mínim entre dosis és de 4 setmanes.

ROTARIX® (GSK), que s'administra en 2 dosis i s'ha de començar a partir de les 6 setmanes i finalitzar a les 24 setmanes com a molt tard. L'interval mínim entre dosis és de 4 setmanes.

Les dosis d'aquestes vacunes **NO** són intercanviables. Per tant, ha de començar i acabar amb la mateixa marca.

<http://vacunasaep.org/familias/vacunas-una-a-una/rotavirus>

– Vacuna contra la meningitis B:

El meningococ és un bacteri causant d'infeccions poc freqüents però molt greus, com meningitis i sèpsia, que poden deixar seqüeles importants. La infecció per meningococ B es pot tractar amb antibiòtics, però a vegades l'avançament de la malaltia és molt ràpid i el tractament no resulta eficaç. La millor prevenció és la vacunació.

El nom comercial d'aquesta vacuna és BEXERO® (GLAXO) i el seu metge i/o infermera els informarà de les dosis necessàries, que variaran segons l'edat en què s'iniciï la vacunació.

<http://vacunasaep.org/familias/vacunas-una-a-una/vacuna-meningococo-b>



– Vacuna contra el papil·loma humà:

El virus del papil·loma humà (VPH) pertany a un grup de virus que infecten la pell i les mucoses. Els tipus de VPH que infecten la regió anogenital es transmeten mitjançant les relacions sexuals: alguns d'aquests causen berrugues genitals o condilomes i altres poden provocar càncer de coll uterí, de vulva, de penis o d'anús. Els tipus de VPH que provoquen càncer s'anomenen de risc alt i són diferents dels tipus dels que causen les berrugues genitals.

La vacuna contra el VPH protegeix contra les infeccions del virus que causen el 70% dels càncers de cèrvix (tipus 16 i 18) i el 90% de les berrugues genitals (tipus 6 i 11).

Al nostre país hi ha dues vacunes disponibles: Gardasil®, que prevé la infecció pels VPH dels tipus 6, 11, 16 i 18, i Cervarix®, que prevé la infecció pels VPH dels tipus 16 i 18.

Aquestes vacunes **NO** són intercanviables. Per tant, ha de començar i acabar amb la mateixa marca.

La vacuna està finançada a totes les alumnes de 6è de primària. De totes maneres, pot ser també efectiva en altres edats, tant en dones com en homes. Si aquest és el seu cas, pot dirigir-se al seu metge o infermera i li indicarà les dosis que necessita. El cost de la vacuna anirà a compte seu.

http://canalsalut.gencat.cat/ca/detalls/article/Papilloma_huma

Consells per a la conservació de les vacunes

Les vacunes són medicaments biològics que perden les seves propietats si no es guarden i transporten de manera adequada. La conservació i la manipulació han de garantir que en el moment de l'administració d'una vacuna es mantingui l'esterilitat i la potència immunitzadora.

Claus a tenir en compte per a una adequada conservació de les vacunes:

- Mantenir les vacunes dins del seu embalatge original fins a la seva utilització.
- Les vacunes s'han de mantenir entre 2° i 8° de temperatura. S'hauria d'intentar mantenir la temperatura de la nevera a 5°.
- Les vacunes han d'estar separades de les parets de la nevera aproximadament 5 cm perquè circuli l'aire al seu interior.
- **No** col·locar vacunes a la porta de la nevera, ja que és on hi ha més oscil·lació de la temperatura. No dipositar vacunes a la part més inferior de la nevera (sota de l'últim prestatge).
- Es recomana tenir-la el menor temps possible a la nevera de casa.
- Mantenir la nevera neta i en condicions òptimes d'ús.
- **NO** guardar-les **MAI** al congelador ni fora de la nevera.

La conservació de la vacuna abans de la seva administració ha de ser a la farmàcia o al domicili. **MAI** es guardaran al CAP.

Interrupció de la cadena del fred

El trencament de la cadena del fred pot tenir com a causa un transport inadequat o bé una desviació de temperatura a la nevera d'emmagatzematge, ja sigui per una utilització incorrecta o causada per interrupció del fluid elèctric.

La pèrdua de potència d'una vacuna està determinada pel tipus de desviació de la temperatura (congelació o elevació per sobre del rang superior), el grau d'aquesta i la seva durada. Per tant, si es dona el cas la vacuna s'haurà de rebutjar.

Les vacunes s'han de transportar en bosses refrigerades sense contacte directe amb els acumuladors de fred.

Altres riscos o complicacions que podrien aparèixer, donada la vostra situació clínica i les vostres circumstàncies personals:.....

En el vostre estat clínic actual, els beneficis derivats de la realització d'aquest procediment superen els possibles riscos.



Consentiment Informat
ADMINISTRACIÓ DE LA VACUNA CONTRA
ROTAVIRUS I/O MENINGITIS B

		1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a
VACUNA ANTIPNEUMOCOC	<input type="checkbox"/> Nombre de dosis que requereix	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
VACUNA ANTIVARICEL·LA	<input type="checkbox"/> Nombre de dosis que requereix	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
VACUNA ANTIROTAVIRUS	<input type="checkbox"/> Nombre de dosis que requereix	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
VACUNA ANTIMENINGITIS B	<input type="checkbox"/> Nombre de dosis que requereix	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
VACUNA ANTIPAPIL·LOMA HUMÀ	<input type="checkbox"/> Nombre de dosis que requereix	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

He estat informat que la venda de medicaments subjecte a prescripció mèdica a través d'internet, a distància, per mitjà de correu/telèfon o altres sistemes similars, està expressament prohibida per la legislació vigent.

Manifesto que se m'ha informat suficientment, de paraula i en forma escrita (havent pogut llegir els fulls informatius sobre el procediment que se'm proposa).

També he estat informat/da de les possibles conseqüències en cas de no portar a terme aquest(s) procediment(s).

He pogut aclarir els dubtes que he tingut en llegir i/o escoltar la informació que se m'ha donat. Sé que puc rebutjar el procediment i puc fer-me enrere quan vulgui de la decisió que ara prenc.

Per tot això prenc lliurement la decisió d'autoritzar que l'equip mèdic que porta el meu fill/a pugui administrar la vacuna.

II. DECLARACIONS I SIGNATURES

Abans de signar el consentiment, no dubteu a demanar qualsevol aclariment addicional que desitgeu.

Amb la signatura d'aquest consentiment, el pacient declara que ha comprès les explicacions que li han estat facilitades, tant per escrit com verbalment, ha tingut l'oportunitat de preguntar i ha rebut resposta a les qüestions que se li han plantejat, i comprèn els riscos i alternatives existents. Així mateix, ha estat informat que pot revocar el present consentiment en qualsevol moment comunicant-ho per escrit a l'equip mèdic que l'atén.

Signatura del pacient:

Nom: Data

Signatura del metge:

Dr./a: Data

Signatura del legal representant: Data

(Nom complet, DNI i relació amb el pacient)

Signatura dels testimonis, si s'escau: Data

(Nom complet i DNI)

"Se li informa que les seves dades es troben enregistrades al fitxer "Pacients", inscrit a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i del que en són titulars FUNDACIÓ ASSISTENCIAL DE MÚTUA DE TERRASSA, FPC, APTIMA CENTRE CLÍNIC, SL i FUNDACIÓ VALLPARADÍS, FPC. La seva finalitat és la prestació de l'assistència mèdico-sanitària i social als seus usuaris. Els destinataris de la informació són els departaments de les tres entitats titulars, de les empreses que formen part del "Grup MútuaTerrassa" (Catlab i CTD) i els estaments públics o privats que per obligació legal o necessitat material per a la deguda prestació de l'assistència hagin de tenir-hi accés. Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se al Servei d'Atenció a l'Usuari de les entitats."