

Títol del treball:

Satisfacció i experiència personal dels usuaris oncològics portadors de reservori vascular subcutani (RVS).

Nom i cognom del ponent

Concepció Pujol Bonastre

Autors

Nom i cognoms	Categoria professional	Institució/Lloc de treball
1. Josep Lluís Gómez Tejero	DUE	H.Martorell/ H.Dia
2. Concepció Pujol Bonastre	DUE	H.Martorell/ H.Dia

Introducció

L'administració de fàrmacs antineoplàsics en cicles repetits per via intravenosa és un dels pilars fonamentals en el tractament oncològic.

L'elecció de la via d'administració es realitza en funció de la duració del tractament, el tipus de fàrmac prescrit, l'accessibilitat de les vies perifèriques i altres factors que depenen de l'usuari.

El 1996 es va instaurar el primer reservori vascular subcutani (RVS) a l'hospital i l'hospital de dia va començar a l'any 2000. A partir del 2005, degut als tractaments de quimioteràpia contínua al domicili, els RVS es van instaurar de forma regular.

Tot i portar més de 15 anys des de la primera instauració i l'existència d'un protocol d'utilització des de l'any 2004, el RVS gairebé no s'utilitza fora de l'hospital de dia.

El RVS suposa una major comoditat per a l'usuari i un menor risc de complicacions relacionades amb la quimioteràpia, s'utilitza poc en els tractaments vesicans, només es col·loca quan és imprescindible.

Objectiu:

Conèixer la satisfacció i l'experiència dels usuaris portadors de RVS de l'hospital de dia d'oncologia de l'hospital de Martorell.

Metodologia:

Disseny: estudi descriptiu transversal dels usuaris oncològics portadors de RVS instaurat a l'hospital Sant Joan de Déu de Martorell des del gener del 2012 al febrer del 2013.

De cada usuari s'ha recollit dos tipus d'informació:

1) Dades sociodemogràfiques i relacionades amb la malaltia, obtingudes de la història clínica del pacient.

2) Qüestionari anònim elaborat per l'equip investigador amb 23 ítems en una escala de resposta tipus likert de 5 punts i 2 preguntes obertes.

S'ha realitzat l'anàlisi estadística descriptiva amb freqüències per les variables categòriques i mitjana per les variables contínues.

Títol del treball:**Satisfacció i experiència personal dels usuaris oncològics portadors de reservori vascular subcutani (RVS).****Resultats:**

Durant el període d'estudi s'han col·locat un total de 30 RVS, el 90% a la vena subclàvia dreta i el 10% a l'esquerra, el 50% en homes i el 50% en dones. L'edat mitjana és de 58,34 anys i les patologies són la neoplàsia colorectal (76,6%), la neoplàsia de mama (16,6%) i altres (6,6%).

Han acceptat respondre el qüestionari 28 usuaris i s'han obtingut els següents resultats:

- És el metge qui informa de la col·locació del RVS. La informació que dona la infermera abans de la punció és satisfactòria en tots els casos.
- Un 33% considera que la instauració és dolorosa i un 7% troba dolorosa la punxada per l'administració del tractament.
- El 80% tenen poques molèsties i poden realitzar les activitats diàries amb normalitat. A un 25% li preocupa tenir alguna complicació i a un 18% li preocupa la percepció estètica, per haver d'explicar els motius.
- Entre els usuaris amb quimioteràpia a domicili, un 12% té por a que se'ls surti l'agulla.
- Un 75% dels usuaris prefereixen la punció del reservori a la d'una vena perifèrica i el percentatge restant és indecís. Tot i això, dels 17 usuaris amb tractament intravenós fora de l'hospital de dia, a un 88% se'ls ha punxat una vena perifèrica.
- Un 75% estan contents amb el RVS, i el 57% està d'acord en mantenir-lo en finalitzar tot el tractament.
- Les preguntes obertes, fan menció de la necessitat d'una major informació abans d'anar a quiròfan, del dolor presentat en els casos en què la canalització de la vena subclàvia no ha estat fàcil, del desconeixement de l'existència del dispositiu, de la bona informació rebuda a l'hospital de dia i expliquen que a urgències els fa molt de respecte el RVS i acostumen a punxar en venes perifèriques.

Conclusions:

Aquest estudi permet detectar que una tercera part dels usuaris manifesten que l'anestèsia local no és suficient. També es demostra que els usuaris que porten més temps amb el reservori presenten menys molèsties.

A partir de la mostra estudiada es confirma que els usuaris prefereixen la punció del reservori en lloc de la via perifèrica, encara que a la pràctica, fora de l'hospital de dia, s'utilitza més la via perifèrica. Els usuaris estudiats, no han tingut cap complicació relacionada amb el reservori, considerem que és un sistema segur.

Títol del treball:

Satisfacció i experiència personal dels usuaris oncològics portadors de reservori vascular subcutani (RVS).